

ОРЛИКС® ЛАКТО: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ФЕРМЕНТА ЛАКТАЗЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПЕРЕВАРИВАНИЯ И УСВОЕНИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

- Самое высокое содержание лактазы в одной таблетке: на 30% выше, чем у средств в категории*
- Широкий возрастной диапазон: разрешен к применению у детей с 3 лет и взрослых



Содержание активного вещества в одной таблетке:
фермент лактаза (бета-галактозидаза) – **4500 ALU (FCC)**.
ALU = Acid Lactase Units (лактазные единицы активности)



ОРЛИКС® ЛАКТО помогает предотвратить возникновение симптомов непереносимости лактозы – боль и дискомфорт в области живота, метеоризм, вздутие живота, диарея при употреблении молока и молочных продуктов.



ОРЛИКС® ЛАКТО позволяет людям с лактазной недостаточностью (в том числе после перенесенных кишечных инфекций в периоде реабилитации) полноценно использовать в рационе питания продукты, содержащие лактозу.

* по состоянию на 02.09.2021, <http://fp.crc.ru/>



ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ ЛАКТОЗОЙ¹:

Все виды молока: цельное, с низким содержанием жира, обезжиренное, порошковое, концентрированное и сгущенное

Сливки

Творог

Мороженое

Сливочные и сырные соусы

Сливочный сыр, мягкие сыры и моцарелла

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЛАКТОЗУ²:

Хлеб и другие хлебобулочные изделия (блинчики, бисквиты, печенье и торты)

Хлопья для завтрака

Пюре и супы быстрого приготовления

Маргарин

Соусы и заправки для салатов, майонез

Чипсы и другие закуски

Бекон, колбаса, сосиски

Протеиновые порошки и батончики

Сладости: леденцы, шоколад и шоколадные конфеты

1. Makharia G., Gibson P. Диета и кишечник. – 2018.

2. Swagerty Jr D. L., Walling A., Klein R. M. Lactose intolerance //American family physician. – 2002. – Т. 65. – №. 9. – С. 1845.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ